

Developmental Milestones health tips

1. Act early by talking to your child's doctor if by 2 months your child: Doesn't respond to loud sounds.
2. Act early by talking to your child's doctor if by 2 months your child: Doesn't watch things as they move
3. Act early by talking to your child's doctor if by 4 months your child: Can't hold head steady
4. Act early by talking to your child's doctor if by 4 months your child: Doesn't push down with legs when feet are placed on a hard surface
5. Act early by talking to your child's doctor if by 6 months your child: Shows no affection for caregivers
6. Act early by talking to your child's doctor if by 6 months your child: Seems very floppy, like a rag doll
7. Act early by talking to your child's doctor if by 9 months your child: Doesn't respond to own name
8. Act early by talking to your child's doctor if by 9 months your child: Doesn't babble ("mama", "baba", "dada")
9. Act early by talking to your child's doctor if at 1 year your child: Doesn't crawl
10. Act early by talking to your child's doctor if at 1 year your child: Loses skills he once had
11. Act early by talking to your child's doctor if by 18 months your child: Doesn't notice or mind when a caregiver leaves or returns
12. Act early by talking to your child's doctor if by 18 months your child: Doesn't copy others
13. Act early by talking to your child's doctor if at 2 years your child: Doesn't know what to do with common things, like a brush, phone, fork, spoon
14. Act early by talking to your child's doctor if at 2 years your child: Doesn't walk steadily
15. Act early by talking to your child's doctor if at 3 years your child: Drools or has very unclear speech
16. Act early by talking to your child's doctor if at 3 years your child: Doesn't make eye contact
17. Act early by talking to your child's doctor if at 4 years your child: Has trouble scribbling
18. Act early by talking to your child's doctor if at 4 years your child: Resists dressing, sleeping, and using the toilet
19. Act early by talking to your child's doctor if at 5 years your child: Is easily distracted, has trouble focusing on one activity for more than 5 minutes
20. Act early by talking to your child's doctor if at 5 years your child: Can't tell what's real and what's make-believe

Consejos para los hitos del desarrollo

1. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 2 meses el niño: No responde a los ruidos fuertes
2. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 2 meses el niño: No sigue con los ojos los objetos que mueven
3. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 4 meses el niño: No puede balancear la cabeza
4. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 4 meses el niño: No empuja con las piernas cuando se pone los pies en una superficie dura.
5. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 6 meses el niño: No demuestra cariño para los cuidadores
6. Responder con antelación por llevar el niño al doctor si para los 6 meses el niño: Parece demasiado flexible, como una muñeca de trapo

7. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 9 meses el niño: No responde a su nombre
8. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 9 meses el niño: No balbucea (“mama”, “papa”, “baba”)
9. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para 1 año el niño: No gatea
10. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para 1 año el niño: Pierde habilidades que había poseído antes
11. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 18 meses el niño: No presta atención o no le importa cuando un cuidador sale o llega
12. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 18 meses el niño: No imita a los demás
13. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 2 años el niño: No sabe que hacer con los objetos normales como un cepillo, teléfono, tenedor o cuchara
14. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 2 años el niño: No camina con estabilidad
15. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 3 años el niño: Babea o no habla claramente
16. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 3 años el niño: No hace contacto con la mirada
17. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 4 años el niño: Tiene dificultad con garabatear
18. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 4 años el niño: Resiste vestirse, dormirse, y usar el servicio
19. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 5 años el niño: Es fácilmente distraído; le es difícil enfocarse en una actividad por más de 5 minutos
20. Actuar con anticipación y hablar con el doctor del niño si para los 5 años el niño: No puede diferenciar entre lo real y lo ficticio